

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di : Firenze, Pistoia, Lido di Camaiore e Grosseto

Settimana dal 9 al 15 settembre 2013

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	TENDENZA
Urticaceae (ortica e parietaria)	Firenze	6,4	13,1	7,1	22,4	17,3	17,9	3,2	↔
	L.di Camaiore	1,6	0,3	0,3	2,9	3,2	1,0	1,0	↔
	Grosseto	1,0	0,3	1,3	0,0	4,5	1,0	1,0	↔
	Pistoia	18,9	8,7	20,8	38,4	34,9	28,8	3,2	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	TENDENZA
Graminaceae (erbe: loglio, avena, etc.)	Firenze	2,6	2,6	3,5	2,2	2,6	1,3	1,0	↔
	L.di Camaiore	1,9	1,0	2,2	1,6	3,8	1,9	5,1	↔
	Grosseto	5,1	1,3	1,9	0,6	3,8	2,6	2,6	↔
	Pistoia	2,9	5,1	2,9	2,6	8,0	3,2	1,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	TENDENZA
Compositae (ambrosia, artemisia, altre piante a fiore es. tarassaco)	Firenze	0,6	0,3	1,6	1,6	0,3	0,6	0,3	↔
	L.di Camaiore	0,3	0,3	1,0	1,3	0,3	0,3	0,3	↔
	Grosseto	1,6	0,3	1,0	0,0	1,0	1,6	0,6	↔
	Pistoia	0,6	1,6	1,0	1,6	1,0	1,0	0,0	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	TENDENZA
Pinaceae (pino, abete, cedro)	Firenze	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	↔
	L.di Camaione	0,0	0,6	0,32	0,0	0,6	0,6	0,3	↔
	Grosseto	0,0	1,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	↔
	Pistoia	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Firenze	2,2	1,3	0,6	1,0	2,2	0,3	0,3	↔
	L.di Camaione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	↔
	Grosseto	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	↔
	Pistoia	3,2	2,2	0,3	1,3	0,6	1,0	0,0	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

		lun 9	mar 10	mer 11	gio 12	ven 13	sab 14	dom 15	TENDENZA
Cheno-amaranthaceae (farinaccio, spinacio, amaranto e altri)	Firenze	2,9	3,2	3,5	2,2	1,9	1,6	0,0	↔
	L.di Camaione	0,6	1,3	0,6	0,3	0,0	0,3	1,3	↔
	Grosseto	5,5	6,7	3,2	4,2	2,9	3,8	4,8	↔
	Pistoia	3,2	1,6	2,9	1,9	2,2	2,2	0,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT in conformità alla Norma UNI 11108:2004
Lido di Camaione: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT secondo la Norma UNI 11108:2004
Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

Inserimento dati: Dott.ssa V. Bigagli - Dr. J. Vannini
Dott.ssa Marzia Onorari



Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>