

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di : Firenze, Pistoia, Lido di Camaiore e Grosseto

Settimana dal 19 al 25 agosto 2013

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Urticaceae (ortica e parietaria)	Firenze	3,2	2,9	15,7	15,7	12,8	15,7	5,5	↑
	L.di Camaiore	np	6,4	7,1	13,1	9,3	7,4	10,3	↑
	Grosseto	3,8	1,3	10,2	7,4	7,0	9,3	5,8	↑
	Pistoia	np	np	21,1	np	np	20,8	14,1	↑

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Graminaceae (erbe: loglio, avena, etc.)	Firenze	1,9	1,0	2,2	1,9	0,6	1,0	1,3	↔
	L.di Camaiore	np	1,0	1,0	1,3	0,6	0,6	1,0	↔
	Grosseto	3,8	1,3	2,6	2,2	4,5	1,0	0,6	↔
	Pistoia	np	np	1,0	np	np	0,3	1,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Compositae (ambrosia, artemisia, altre piante a fiore es. tarassaco)	Firenze	0,3	2,6	6,7	7,7	1,6	0,6	1,3	↑
	L.di Camaiore	np	1,9	2,9	3,2	1,6	0,3	0,3	↑
	Grosseto	1,6	2,6	21,8	4,5	5,1	3,2	1,9	↑
	Pistoia	np	np	8,3	np	np	3,8	0,3	↑

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Oleaceae (frassino, olivo)	Firenze	0,6	0,6	1,6	0,3	0,6	0,3	0,0	↓
	L.di Camaiore	np	1,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	↓
	Grosseto	0,0	1,0	2,2	0,0	0,6	2,2	1,0	↓
	Pistoia	np	np	0,6	np	np	0,0	0,6	↓

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Pinaceae (pino, abete, cedro)	Firenze	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	L.di Camaione	np	1,9	1,0	1,6	0,3	0,6	3,8	↔
	Grosseto	0,0	0,3	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3	↔
	Pistoia	np	np	1,3	np	np	0,6	1,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Fagaceae (quercia, castagno, faggio)	Firenze	0,3	0,9	2,6	0,3	0,0	0,6	0,0	↓
	L.di Camaione	np	13,1	12,8	3,5	0,0	1,9	2,9	↓
	Grosseto	0,3	0,3	0,0	0,3	1,6	0,0	0,0	↓
	Pistoia	np	np	4,2	np	np	3,8	0,9	↓

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Firenze	2,2	1,0	0,6	2,6	0,6	1,0	1,3	↔
	L.di Camaione	np	1,0	1,3	1,0	0,0	0,3	2,2	↔
	Grosseto	1,0	0,6	1,3	0,6	0,6	0,6	0,0	↔
	Pistoia	np	np	2,6	np	np	1,6	0,6	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Poligonaceae (romice e altre erbe)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	L.di Camaiore								
	Grosseto								
	Pistoia	np	np	0,0	np	np	0,0	0,0	↔

	Concentrazione bassa		↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto			
	assente			
nr	non rilevato			

		lun 19	mar 20	mer 21	giovedì 22	ven 23	sab 24	dom 25	TENDENZA
Cheno-amaranthaceae (farinaccio, spinacio, amaranto e altri)	Firenze	1,6	0,3	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	↔
	L.di Camaiore	np	1,0	0,6	0,3	0,0	0,6	0,3	↔
	Grosseto	4,2	2,6	3,8	1,6	3,2	1,6	4,8	↔
	Pistoia	np	np	1,6	np	np	1,9	1,9	↔

	Concentrazione bassa		↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto			
	assente			

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT in conformità alla Norma UNI 11108:2004
 Lido di Camaiore: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT secondo la Norma UNI 11108:2004
 Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

Inserimento dati: Dott.ssa V. Bigagli - Dr. J. Vannini
 Dott.ssa Marzia Onorari



Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>