

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di : Firenze, Pistoia, Lido di Camaiore e Grosseto

Settimana dal 23 al 29 settembre 2013

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticaceae (ortica e parietaria)		lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	TENDENZA
	Firenze	28,2	16,7	17,6	13,5	14,4	11,2	1,9	↔
	L.di Camaiore	12,8	4,8	2,9	1,3	14,7	11,5	7,1	↔
	Grosseto	1,6	0,0	1,3	0,6	0,0	0,0	0,0	↔
	Pistoia	47,4	48,4	34,9	32,4	26,3	29,5	5,5	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Graminaceae (erbe: loglio, avena, etc.)		lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	TENDENZA
	Firenze	0,6	1,6	0,6	0,3	0,0	0,6	0,3	↔
	L.di Camaiore	4,2	1,0	1,3	0,6	1,3	0,0	0,6	↔
	Grosseto	2,6	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	↔
	Pistoia	2,6	2,6	1,6	1,0	1,3	1,3	0,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre piante a fiore es. tarassaco)		lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	TENDENZA
	Firenze	6,7	17,3	8,7	19,5	7,1	20,8	1,0	↔
	L.di Camaiore	1,0	0,0	0,3	0,6	2,2	1,3	0,0	↔
	Grosseto	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	Pistoia	1,9	5,1	4,8	1,9	3,5	9,6	0,6	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Plantaginaceae (piantaggine)		lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	TENDENZA
	Firenze	0,0	0,6	0,3	0,3	0,6	1,0	0,0	↔
	L.di Camaiore	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	Grosseto	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	Pistoia	1,9	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Cheno- amaranthaceae (farinaccio, spinacio, amaranto e altri)		lun 23	mar 24	mer 25	gio 26	ven 27	sab 28	dom 29	TENDENZA
	Firenze	0,6	1,0	1,9	0,3	0,3	0,0	1,0	↔
	L.di Camaione	0,3	0,3	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	↔
	Grosseto	1,6	1,6	1,0	1,0	1,3	0,3	0,0	↔
	Pistoia	1,3	1,6	0,6	3,2	1,9	1,0	0,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

 Tendenza in aumento
 Tendenza stazionaria
 Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT in conformità alla Norma UNI 11108:2004
 Lido di Camaione: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT secondo la Norma UNI 11108:2004
 Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

Inserimento dati: Dott.ssa V. Bigagli - Dr. J. Vannini
 Dott.ssa Marzia Onorari



Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>