

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Dati settimanali per Firenze e Lido di Camaiore non disponibili per problemi tecnici. Nella settimana alcuni giorni con precipitazioni piovose hanno contenuto i valori pollinici tuttavia in atmosfera sono presenti molte varietà polliniche con valori più significativi per cipresso (in sensibile diminuzione), carpino nero (Corylaceae, in probabile aumento ad Arezzo), frassino (Oleaceae) e platano. Più o meno bassi gli altri valori; in probabile aumento i pollini di Urticaceae (ortica e parietaria).

Settimana dal 01 Aprile al 07 Aprile 2019

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Aceraceae (Acer) | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | ↔ |
| Firenze | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |
| Grosseto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.4 | 1.6 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Betulaceae (ontano betulla) | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 12.8 | 15.1 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | ↑ |
| Firenze | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |
| Grosseto | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero) | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 33.5 | 30.7 | 11.6 | 2.0 | 3.2 | 5.6 | 13.1 | ↑ |
| Firenze | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |
| Grosseto | 15.9 | 37.1 | 0.4 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.) | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 286.5 | 237.5 | 69.7 | 47.8 | 17.5 | 19.9 | 57.0 | ↓ |
| Firenze | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |
| Grosseto | 129.5 | 125.5 | 25.9 | 5.2 | 5.2 | 9.6 | 11.6 | ↓ | |
| Lido di Camaiore | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Fagaceae (quercia, faggio castagno) | Arezzo | 8.8 | 15.9 | 12.0 | 2.0 | 4.4 | 6.8 | 10.0 | ↑ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 7.6 | 8.0 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco) | Arezzo | 4.0 | 3.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | ↔ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 2.0 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | Arezzo | 6.4 | 67.7 | 29.9 | 11.2 | 4.4 | 4.8 | 8.4 | ↔ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 34.3 | 32.3 | 14.3 | 4.4 | 8.4 | 9.2 | 4.8 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Pinaceae (pino, cedro) | Arezzo | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | ↔ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 9.6 | 10.4 | 7.6 | 0.8 | 8.8 | 0.8 | 0.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Plantaginaceae (piantaggine) | Arezzo | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ↔ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Platanaceae (platano) | Arezzo | 374.1 | 174.9 | 44.6 | 29.1 | 6.0 | 64.2 | 50.6 | ↔ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 70.5 | 53.8 | 149.8 | 34.3 | 15.9 | 40.6 | 25.5 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Salicaceae (pioppo salice) | Arezzo | 12.4 | 8.8 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 5.2 | 6.0 | ↔ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 8.0 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 1 | Mar 2 | Mer 3 | Gio 4 | Ven 5 | Sab 6 | Dom 7 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Urticaceae (Ortica e Parietaria) | Arezzo | 1.2 | 3.2 | 2.4 | 12.8 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | ↑ |
| | Firenze | nd | |
| | Grosseto | 25.9 | 16.3 | 16.3 | 5.2 | 18.3 | 22.7 | 22.3 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | nd | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)