MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN DRIMO DIANO

Nella settimana si segnalano, in tutte le stazioni, concentrazioni da medie a elevate per Cupressaceae (Cipresso). Concentrazioni da basse a medie per Alnus (Ontano) con valori elevati a Lido di Camaiore nel fine settimana. Concentrazioni basse per Corylus (Nocciolo) e per Ulmaceae (Olmo). Si segnala un valore elevato per Oleaceae a Grosseto nella giornata di domenica e valori elevati di Urticaceae nella stazione di Lido di Camaiore nella seconda metà della settimana.

Settimana dal 15 Febbraio al 21 Febbraio 2021

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | realition of politic per metre cape a dire | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--|
| | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA | |
| Betulaceae | Arezzo | 4.8 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 16.7 | 10.0 | 1 | |
| (ontano | Firenze | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 13.1 | 2.8 | 37.9 | 1 | |
| | Grosseto | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | \ | |
| betulla) | Lido di Camaiore | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 39.4 | 115.9 | 87.3 | 99.6 | 1 | |


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| 0 | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Corylaceae | Arezzo | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | \ |
| (carpino bianco, | Firenze | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 4.0 | \ |
| nocciolo, | Grosseto | 1.6 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| carnino nero) | Lido di Camaiore | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | |


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressacee | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA |
|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| /Taxaceee | Arezzo | 20.3 | 8.0 | 1.2 | 15.1 | 44.2 | 282.5 | 1928.5 | 1 |
| (cipresso, tasso, | Firenze | 35.5 | 44.2 | 51.0 | 208.8 | 2410.6 | 1811.8 | 3792.9 | 1 |
| | Grosseto | 6.4 | 10.4 | 8.0 | 185.3 | 248.2 | 714.4 | 643.9 | 1 |
| etc.) | Lido di Camaiore | 13.9 | 2.8 | 20.3 | 55.0 | 341.5 | 577.4 | 430.3 | 1 |


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

| 01 | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Oleaceae | Arezzo | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | \longleftrightarrow |
| (frassino, olivo, | Firenze | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | \longleftrightarrow |
| orniello, ligustro, | Grosseto | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 5.2 | 4.8 | 10.8 | 27.1 | 1 |
| etc.) | Lido di Camaiore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | ₽ |






Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA |
|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Salicaceae | Arezzo | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 1 |
| | Firenze | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 3.6 | 29.9 | 12.4 | 23.9 | 1 |
| (pioppo | Grosseto | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 10.8 | 15.1 | 6.4 | 1 |
| salice) | Lido di Camaiore | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | 8.0 | 39.8 | 1 |


| | Concentrazione bassa |
|----|----------------------|
| | Concentrazione media |
| | Concentrazione alta |
| nd | non disponibile |
| | assente |



Numero di pollini per metro cubo d'aria


| | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Ulmaceae (olmo) | Arezzo | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 11.6 | 11.2 | \leftrightarrow |
| | Firenze | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 17.1 | 9.2 | 9.6 | 17.9 | |
| | Grosseto | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 4.4 | 1.6 | |
| | Lido di Camaiore | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 2.4 | \leftrightarrow |


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 15 | Mar 16 | Mer 17 | Gio 18 | Ven 19 | Sab 20 | Dom 21 | TENDENZA |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Urticacee | Arezzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | |
| | Firenze | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 4.8 | |
| (Ortica e | Grosseto | 6.8 | 1.6 | 13.9 | 15.9 | 6.0 | 22.3 | 25.9 | \leftarrow |
| Parietaria) | Lido di Camaiore | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 82.1 | 105.6 | 73.3 | 17.9 | ← |





Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

