MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO


Nella settimana si segnalano valori medio-alti di pollini di Plantaginaceae nella stazione di Arezzo e Firenze. Concentrazioni basse o nulle per le altrespecie arboree ed erbacee.

Settimana dal 19 Luglio al 25 Luglio 2021

Numero di pollini per metro cubo d'aria

				a. po	poo o	abo a ama			
Amarantaceae		Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	TENDENZA
(Chenopodiaceae/	Arezzo	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	\rightleftharpoons
Amaranthaceae)	Firenze	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	0.0	0.4	\rightleftharpoons
(barbabietola,	Grosseto	2.8	2.0	2.4	2.4	2.8	2.4	4.0	\Rightarrow
farinaccio, spinacio.	Lido di Camaiore	1.6	1.2	0.0	0.0	0.8	1.2	2.0	\Rightarrow


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

	Trainere ai penini per metre cape a ana								
		Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	TENDENZA
Fagaceae	Arezzo	3.2	13.1	21.1	7.2	7.2	2.8	15.9	₽
	Firenze	12.0	13.1	23.1	10.4	7.2	2.8	6.0	↓
(quercia, faggio	Grosseto	9.6	4.4	5.6	17.5	3.6	4.0	12.8	\Leftrightarrow
castagno)	Lido di Camaiore	64.5	30.7	15.9	8.8	10.4	13.1	23.5	Û


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae		Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	TENDENZA
(gramigna	Arezzo	6.0	6.4	6.0	2.8	8.4	4.8	11.2	\longleftrightarrow
	Firenze	4.0	7.6	4.0	6.0	8.4	4.0	7.2	\longleftrightarrow
orzo, segale,	Grosseto	6.0	6.8	2.8	7.2	3.6	1.6	7.2	\longleftrightarrow
avena	Lido di Camaiore	6.4	2.8	1.6	4.0	5.2	4.8	6.0	\iff
granoturco)									


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	TENDENZA
Oleaceae	Arezzo	0.0	0.0	0.4	5.2	0.8	1.2	3.2	<u>↑</u>
(frassino, olivo,	Firenze	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	<u>1</u>
orniello, ligustro,	Grosseto	2.8	0.4	0.8	8.4	0.4	0.4	4.4	\
etc.)	Lido di Camaiore	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	Û






Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	TENDENZA
Plantaginaceae	Arezzo	1.6	3.6	1.2	2.8	2.8	3.6	3.2	\rightleftharpoons
(piantaggine)	Firenze	0.8	3.6	1.6	2.4	2.0	3.6	4.0	\rightleftharpoons
	Grosseto	0.8	2.4	0.4	2.0	1.2	0.4	0.0	
	Lido di Camaiore	2.4	0.8	2.0	1.6	2.0	1.6	1.2	


	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	TENDENZA
Urticacee	Arezzo	24.3	35.1	12.8	10.4	13.9	8.0	10.4	
10 11	Firenze	24.7	30.7	12.0	19.9	25.1	12.0	12.8	
(Ortica e	Grosseto	26.7	32.3	13.1	25.9	8.8	6.0	5.6	
Parietaria)	Lido di Camaiore	13.1	21.5	13.1	6.8	11.6	12.4	11.2	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente



Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

