MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



In primo piano:

Nella settimana si rilevano concentrazioni generalmente elevate per le Plantaginaceae; per le Gramineae si rilevano concentrazioni da medie a elevate ad Arezzo e Firenze mentre a Grosseto e Lido si mantengono tra valori bassi e medi. Per le Fagaceae (fioritura del Castagno) si osservano valori da medi a elevati ad Arezzo, Firenze e Lido, generalmente bassi a Grosseto. Valori da bassi a medi per le Oleaceae (Olivo) e valori generalmente bassi per le Urticaceae in tutte le stazioni si segnataro concentrazioni da medi a elevati ad Arezzo, Firenze e Lido, generalmente bassi a Grosseto. Valori da bassi a medi per le Amaranthaceae a Grosseto.

spinacio, amaranto,	farinaccio,	(barbabietola,		
		spinacio, amaranto,	(barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto,	nthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto,
aceae/ Amara nthaceae) (barbabietola,	aceae/ Amara nthaceae)	aceae/ Amara		
nthaceae) (barbabietola,	aceae/ Amara nthaceae)	aceae/ Amara		e (Chenopodi

stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Arezzo	1.6	0.8	1.6	0.0	0.4	0.4	1.2	←→
Firenze	2.0	2.8	1.2	2.4	2.0	1.6	1.6	←→
Grosseto	9.6	4.8	4.0	7.2	8.0	4.8	7.6	←→
Lido di Camaiore	0.0	0.8	1.6	2.0	0.0	0.8	0.0	\leftrightarrow

nd

Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta non disponibile assente Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Fagaceae (quercia, faggio, castagno)	
castagno)	


stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Arezzo	10.8	17.1	57.4	53.0	23.1	51.0	87.3	\longleftrightarrow
Firenze	16.7	25.1	50.2	43.8	24.7	15.9	43.4	\longleftrightarrow
Grosseto	13.9	8.8	6.8	11.2	19.9	16.3	27.1	←→
Lido di Camaiore	33.9	23.5	175.7	96.4	30.3	34.7	124.7	\longleftrightarrow

nd

Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta non disponibile assente Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Gramineae
(gramigna,
orzo, segale,
avena,
granoturco)

stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Arezzo	34.7	31.1	55.4	33.1	31.5	27.9	25.9	↔
Firenze	35.1	35.1	20.7	24.7	25.5	14.3	18.3	←→
Grosseto	16.3	2.4	4.8	6.4	8.0	13.5	13.5	↔
Lido di Camaiore	2.0	3.6	11.6	6.0	6.0	8.8	9.2	\longleftrightarrow



Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta non disponibile assente

1	Tendenza in aumento
←	Tendenza stazionaria
Î	Tendenza in diminuzione

Oleaceae
(frassino,
olivo, orniello,
ligustro, etc.)

stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Arezzo	12.8	2.8	8.4	6.8	3.6	2.4	5.2	Î
Firenze	5.6	2.4	1.6	4.4	3.6	1.2	1.2	Î
Grosseto	6.4	2.4	0.8	3.6	3.6	4.0	3.2	Î
Lido di Camaiore	5.6	2.4	2.4	2.8	1.2	4.4	2.4	1

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Tendenza in aumento Tendenza stazionaria Tendenza in diminuzione

	stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Pinaceae	Arezzo	0.4	1.6	0.8	0.4	0.8	2.0	0.4	←→
(pino, cedro)	Firenze	4.4	2.4	2.4	0.4	0.8	1.6	0.8	\leftrightarrow
,	Grosseto	3.2	0.8	0.8	2.0	1.2	2.4	2.0	\leftrightarrow
	Lido di Camaiore	1.2	3.2	1.6	2.4	3.2	6.8	0.4	\leftrightarrow

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Arezzo	4.4	8.0	13.5	10.4	11.2		7.6	\(\)
Firenze	12.0	10.0	8.4	4.4	8.0	7.2	10.4	\longleftrightarrow
Grosseto	0.8	0.4	2.4	1.2	3.6	4.8	8.0	\longleftrightarrow
Lido di Camaiore	3.6	1.6	3.6	4.0	3.6	3.2	2.0	\longleftrightarrow
	Arezzo Firenze Grosseto	Arezzo 4.4 Firenze 12.0 Grosseto 0.8	Arezzo 4.4 8.0 Firenze 12.0 10.0 Grosseto 0.8 0.4	Arezzo 4.4 8.0 13.5 Firenze 12.0 10.0 8.4 Grosseto 0.8 0.4 2.4	Arezzo 4.4 8.0 13.5 10.4 Firenze 12.0 10.0 8.4 4.4 Grosseto 0.8 0.4 2.4 1.2	Arezzo 4.4 8.0 13.5 10.4 11.2 Firenze 12.0 10.0 8.4 4.4 8.0 Grosseto 0.8 0.4 2.4 1.2 3.6	Arezzo 4.4 8.0 13.5 10.4 11.2 13.5 Firenze 12.0 10.0 8.4 4.4 8.0 7.2 Grosseto 0.8 0.4 2.4 1.2 3.6 4.8	Arezzo 4.4 8.0 13.5 10.4 11.2 13.5 7.6 Firenze 12.0 10.0 8.4 4.4 8.0 7.2 10.4 Grosseto 0.8 0.4 2.4 1.2 3.6 4.8 8.0

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd
non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

	stazione	Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	Tendenza
Urticacee	Arezzo	17.9	17.1	26.3	14.3	10.4	11.6	19.1	←→
(Ortica e Parietaria)	Firenze	19.5	16.3	24.3	15.1	12.0	12.4	14.3	\longleftrightarrow
	Grosseto	11.6	3.6	6.0	9.6	8.8	6.8	15.9	←→
	Lido di Camaiore	10.8	4.0	20.3	16.3	13.5	9.2	15.9	\longleftrightarrow

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

