MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO

Nella settimana si rilevano concentrazioni generalmente medie per il Cipresso nella prima parte della settimana su tutte le stazioni, favorite probabilmente dalle temperature miti; valori poi in calo nella seconda parte della settimana. Concentrazioni generalmente basse per le altre specie a fioritura invernale fatta eccezione per il Frassino a Lido che mostra valori tra medi ed elevati nella seconda parte della settimana.

Settimana dal 03 Gennaio al 09 Gennaio 2022

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
Betulaceae	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	\longleftrightarrow
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	\longleftrightarrow
(ontano	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\longleftrightarrow
betulla)	Lido di Camaiore	nd	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	\longleftrightarrow


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

0		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
Corylaceae	Arezzo	1.2	4.4	9.6	1.2	0.8	1.2	0.4	\longleftrightarrow
(carpino bianco,	Firenze	0.0	2.0	1.2	2.8	4.8	2.0	0.8	\longleftrightarrow
nocciolo,	Grosseto	1.6	0.4	0.0	1.2	1.2	0.8	0.0	\longleftrightarrow
carnino nero)	Lido di Camaiore	nd	0.0	2.4	33.9	7.2	6.8	15.1	\Leftrightarrow


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
/Taxaceee	Arezzo	63.4	80.9	80.5	28.3	3.2	1.6	5.2	
(cipresso, tasso,	Firenze	26.3	51.0	114.8	10.8	3.2	1.2	5.6	
	Grosseto	10.0	26.7	35.9	7.6	6.4	1.2	4.8	
etc.)	Lido di Camaiore	nd	0.8	34.3	4.4	0.0	3.2	5.6	


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

01		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
Oleaceae	Arezzo	1.2	0.8	1.6	0.4	0.0	0.0	0.4	\longleftrightarrow
(frassino, olivo,	Firenze	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	\longleftrightarrow
orniello, ligustro,	Grosseto	0.8	0.8	2.0	0.0	0.8	0.0	0.4	\longleftrightarrow
etc.)	Lido di Camaiore	nd	0.4	17.1	19.5	3.6	0.4	26.3	₽






Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
Urticacee	Arezzo	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	\leftrightarrow
	Firenze	0.0	2.0	2.0	0.8	2.4	4.8	0.0	
(Ortica e	Grosseto	0.4	1.2	4.0	0.4	0.0	0.4	0.0	←→
Parietaria)	Lido di Camaiore	nd	2.0	0.8	2.8	0.8	0.0	4.8	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente



Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

