

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si rilevano concentrazioni generalmente basse per tutte le famiglie erbacee tipiche del periodo, fatta eccezione per sporadici valori medi per Plantaginaceae in tutte le Stazioni e per Amarantaceae nella Stazione di Grosseto.

Settimana dal 28 Agosto al 03 Settembre 2023

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Gio 31 | Ven 1 | Sab 2 | Dom 3 | TENDENZA |
|------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| | | Urticacee | Arezzo | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 2.8 |
| (Ortica e Parietaria) | Firenze | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 11.2 | ↔ |
| | Grosseto | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 4.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 0.8 | 8.4 | 4.4 | 3.6 | 1.6 | 4.4 | 12.4 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Gio 31 | Ven 1 | Sab 2 | Dom 3 | TENDENZA |
|--|------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| | | Gramineae | Arezzo | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| (gramigna orzo, segale, avena granoturco) | Firenze | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | ↔ |
| | Grosseto | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 2.8 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|--|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Gio 31 | Ven 1 | Sab 2 | Dom 3 | TENDENZA |
|----------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| | | Plantaginaceae | Arezzo | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| (piantaggine) | Firenze | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↔ |
| | Grosseto | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Gio 31 | Ven 1 | Sab 2 | Dom 3 | TENDENZA |
|--|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| | | Compositae | Arezzo | 4.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 |
| (ambrosia, artemisia, altre compositae) | Firenze | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | ↔ |
| | Grosseto | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | 4.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Gio 31 | Ven 1 | Sab 2 | Dom 3 | TENDENZA |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|
| Amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc) | Arezzo | 1.2 | 4.8 | 0.4 | 2.0 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | ↔ |
| | Firenze | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | ↔ |
| | Grosseto | 5.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 7.6 | 15.1 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | ↔ |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | | non disponibile |
| | | assente |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpato.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)