

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di : Pistoia, Firenze, Lido di Camaiore, e Grosseto

Settimana dal 25 al 31 agosto 2014

Per le spore di *Alternaria*, che ha interesse allergologico, vengono indicati i valori soglia che possono scatenare una sintomatologia allergica.

		Numero di spore per metro cubo d'aria							TENDENZA
		lun 25	mar 26	mer 27	giovedì 28	ven 29	sab 30	dom 31	
Pistoia	<i>Alternaria</i>	17,5	17,9	17,1	45,0	49,8	39,5	44,6	↔
Firenze	<i>Alternaria</i>	29,1	50,2	31,9	33,9	36,3	40,6	39,1	↔
Lido di Camaiore	<i>Alternaria</i>	9,2	8,0	2,0	8,4	16,3	12,4	8,8	↔
Grosseto	<i>Alternaria</i>	13,2	27,1	39,1	47,0	39,9	30,7	42,2	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione alta
np	non pervenuto

assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT, in conformità alla Norma UNI 11108:2004
Lido di Camaiore: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT, secondo la Norma UNI 11108:2004
Predispersione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro
Inserimento dati :Dott.ssa V.Bigagli Dott J.Vannini
Dott.ssa M.Onorari



Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Il bollettino è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)