MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE

Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO:

Le condizioni di caldo-umido dovrebbero far incrementare le concentrazioni in atmosfera delle spore di Alternaria

Settimana dal 07 Settembre al 13 Settembre 2015

Numero di pollini per metro cubo d'aria

	Numero di polititi per metro cubo d'ana								
		Lun 7	Mar 8	Mer 9	Gio 10	Ven 11	Sab 12	Dom 13	TENDENZA
Alternaria	Firenze	14.7	10.4	19.5	45.0	27.9	22.7	14.7	1
	Pistoia	23.1	33.5	37.1	76.9	121.1	38.3	3.6	1
	Grosseto	90.8	66.5	60.6	38.6	29.5	16.3	10.8	1
	Lido di Camaiore	47.8	20.3	48.6	20.3	69.3	25.1	10.0	1

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

