

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

In tutte le stazioni ancora la spora fungina *Alternaria* è presente, con sporadici valori medi (soprattutto nelle stazioni di costa, Grosseto e Lido di Camaiore) e valori decisamente bassi nelle altre stazioni più interne.

Settimana dal 05 Novembre al 11 Novembre 2018

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 5	Mar 6	Mer 7	Gio 8	Ven 9	Sab 10	Dom 11	TENDENZA
Alternaria	Arezzo	4.4	5.6	5.6	11.6	5.2	8.8	10.0	↔
	Firenze	3.6	2.8	5.6	10.8	2.8	5.6	3.2	↔
	Grosseto	2.4	4.0	1.6	5.2	12.0	9.6	21.5	↓
	Lido di Camaiore	6.0	2.4	0.8	35.5	42.2	19.1	4.8	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qc-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)