

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaione (LU)
IN PRIMO PIANO:

In tutte le stazioni ancora presenza della spora fungina *Alternaria* con valori da medi (Arezzo e Firenze) a elevati (Lido e soprattutto Grosseto). Tendenza verso la diminuzione.

Settimana dal 15 Ottobre al 21 Ottobre 2018

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 15	Mar 16	Mer 17	Gio 18	Ven 19	Sab 20	Dom 21	TENDENZA
Alternaria	Arezzo	15.5	19.9	12.8	18.3	12.0	14.7	19.5	↓
	Firenze	27.1	12.8	9.2	13.9	18.7	15.5	10.0	↓
	Grosseto	83.7	72.5	9.2	124.3	78.5	149.0	170.5	↓
	Lido di Camaione	nd	28.3	66.9	53.4	20.3	20.3	172.1	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qc-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)