ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano concentrazioni generalmente medie per la spora fungina Alternaria, con sporadici valori elevati nella stazione di Firenze.

Settimana dal 30 Agosto al 05 Settembre 2021

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 30	Mar 31	Mer 1	Gio 2	Ven 3	Sab 4	Dom 5	TENDENZA
Alternaria	Arezzo	71.7	45.0	45.4	52.6	27.9	34.3	59.4	⟷
	Firenze	105.6	65.7	63.4	77.3	123.9	85.3	131.9	↓
	Grosseto	44.6	16.3	26.7	26.3	47.0	27.9	28.3	⟷
	Lido di Camaiore	37.1	6.0	11.2	14.3	36.7	23.1	27.1	⟷

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente

↑	Tendenza in aumento
⟷	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS

Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/app)