

Radioattività

Concentrazione media annua di cesio-137 in acque superficiali

Corpo idrico	Punto di prelievo	2012	2013	2014	2015
		media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)
Fiume Arno	Firenze	< 0,001	< 0,009	< 0,009	< 0,010
Fiume Arno	Pisa (Calcinaia)	< 0,001	< 0,01	< 0,013	< 0,010
Fiume Ombrone	Grosseto (Istia d'Ombrone)	< 0,003	< 0,009	< 0,008	< 0,009
Fiume Serchio	Vecchiano (PI)	-	< 0,01	< 0,009	< 0,010
Fiume Tevere	Sansepolcro (AR)	-	< 0,008	< 0,009	< 0,011

Corpo idrico	Punto di prelievo	2016	2017	2019
		media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)
Fiume Arno	Firenze	< 0,013	< 0,006	< 0,005
Fiume Arno	Pisa (Calcinaia)	< 0,009	< 0,007	< 0,006
Fiume Ombrone	Grosseto (Istia d'Ombrone)	< 0,008	< 0,010	< 0,005
Fiume Serchio	Vecchiano (PI)	< 0,009	< 0,006	< 0,004
Fiume Tevere	Sansepolcro (AR)	< 0,008	< 0,005	< 0,005

n.b. i dati relativi all'anno 2018 non sono disponibili

