

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun15	Mar 16	Mer 17	Gio 18	Ven 19	Sab 20	Dom 21	TENDENZA
		Gramineae (gramigna, orzo, segale, avena, granoturco)	Firenze	8,0	16,7	13,2	26,7	21,5	19,1
Pistoia	7,2		15,5	6,8	27,9	21,5	12,4	8,8	↓
Grosseto	5,2		8,0	5,6	19,1	18,3	5,6	7,6	↓
L.di Camaione	np		np	np	np	np	np	np	↓

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun15	Mar 16	Mer 17	Gio 18	Ven 19	Sab 20	Dom 21	TENDENZA
		Fagaceae (quercia, faggio, castagno)	Firenze	5,2	16,7	25,9	54,6	47,4	65,4
Pistoia	12,0		12,8	31,5	74,1	85,3	61,4	48,6	↑
Grosseto	5,6		4,8	6,8	17,9	30,7	11,6	8,8	↑
L.di Camaione	np		np	np	np	np	np	np	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun15	Mar 16	Mer 17	Gio 18	Ven 19	Sab 20	Dom 21	TENDENZA
		Plantaginaceae (piantaggine)	Firenze	2,4	3,6	4,0	5,6	4,8	4,8
Pistoia	0,0		7,6	3,6	2,8	2,0	3,2	1,6	↔
Grosseto	1,6		4,4	4,4	5,2	8,8	4,0	2,4	↔
L.di Camaione	np		np	np	np	np	np	np	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

		Lun15	Mar 16	Mer 17	Gio 18	Ven 19	Sab 20	Dom 21	TENDENZA
		Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)	Firenze	0,4	0,4	1,2	0,8	0,4	0,0
Pistoia	0,0		0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	↔
Grosseto	2,0		4,0	4,0	2,4	5,6	4,8	6,8	↔
L.di Camaione	np		np	np	np	np	np	np	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

		Lun15	Mar 16	Mer 17	Gio 18	Ven 19	Sab 20	Dom 21	TENDENZA
		Polygonaceae (rabarbaro, acetosella, grano saraceno)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,4
Pistoia	0,0		0,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	↔
Grosseto	0,4		0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	↔
L.di Camaione	np		np	np	np	np	np	np	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria

np	non pervenuto
	assente

↓ Tendenza in diminuzione

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro



Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Il bollettino è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)