

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano concentrazioni complessivamente medio-elevate per le Cupressaceae (Cipresso) su Arezzo, Firenze e Grosseto. Su Lido di Camaiore permangono valori ancora bassi. Valori complessivamente bassi per le Corylaceae (Nocciolo) e le Betulaceae (Ontano) su tutte le stazioni. Valori sporadicamente medi per Oleaceae (Frassino) per Firenze e fino ad elevati per Lido di Camaiore nella giornata di Domenica. Si segnalano infine valori medi per le Urticaceae su Grosseto e Lido di Camaiore nel fine settimana probabilmente favoriti dalle temperature insolitamente miti per il periodo.

Settimana dal 27 Gennaio al 02 Febbraio 2020

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Betulaceae (ontano betulla) | | Lun 27 | Mar 28 | Mer 29 | Gio 30 | Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.4 | 5.6 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 15.1 | ↔ |
| Firenze | 0.0 | 10.0 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 3.6 | 13.1 | ↔ | |
| Grosseto | nd | nd | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | 6.4 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero) | | Lun 27 | Mar 28 | Mer 29 | Gio 30 | Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.0 | 5.2 | 6.8 | 12.0 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | ↑ |
| Firenze | 0.0 | 13.1 | 7.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 15.9 | ↑ | |
| Grosseto | nd | nd | 2.8 | 13.1 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | 1.6 | 9.6 | 17.1 | 0.4 | 3.2 | 5.6 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.) | | Lun 27 | Mar 28 | Mer 29 | Gio 30 | Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 19.5 | 174.1 | 539.5 | 20.7 | 47.4 | 267.4 | 471.4 | ↑ |
| Firenze | 7.2 | 174.1 | 151.0 | 21.9 | 10.0 | 32.3 | 72.9 | ↑ | |
| Grosseto | nd | nd | 319.2 | 23.1 | 34.7 | 308.0 | 869.4 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | 4.4 | 15.5 | 5.6 | 2.0 | 2.8 | 12.0 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | | Lun 27 | Mar 28 | Mer 29 | Gio 30 | Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Arezzo | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | ↔ |
| Firenze | 0.4 | 7.2 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 13.5 | ↔ | |
| Grosseto | nd | nd | 1.2 | 4.4 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 0.4 | 0.4 | 38.6 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 27 | Mar 28 | Mer 29 | Gio 30 | Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| Urticacee (Ortica e Parietaria) | Arezzo | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ↔ |
| | Firenze | 0.0 | 11.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.8 | ↔ |
| | Grosseto | nd | nd | 17.1 | 10.4 | 9.6 | 31.5 | 36.7 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 24.3 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|--|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento Tendenza stazionaria Tendenza in diminuzione |
| | Concentrazione media | | |
| | Concentrazione alta | | |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpato.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)