

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano concentrazioni elevate per Cupressaceae, da medie ad elevate per Oleaceae (Frassino) e da basse a medie per Urticaceae in tutte le stazioni. Valori generalmente medi per Betulaceae (Ontano) a Lido di Camaiore. Compaiono in atmosfera i primi pollini di Platanaceae e Ostrya (Corylaceae).

Settimana dal 08 Marzo al 14 Marzo 2021

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Aceraceae (Acer) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 10.4 | 4.4 | 12.0 | ↑ |
| Firenze | 1.6 | 3.2 | 1.2 | 15.1 | 25.1 | 38.6 | 16.3 | ↑ | |
| Grosseto | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Betulaceae (ontano betulla) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 2.8 | 2.0 | 3.6 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | ↔ |
| Firenze | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.4 | ↔ | |
| Grosseto | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 5.2 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 30.3 | 38.6 | 17.9 | 58.2 | 15.1 | 28.7 | 32.7 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|--|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | ↑ |
| Firenze | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 6.4 | ↑ | |
| Grosseto | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 9.2 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 701.3 | 3473.3 | 427.5 | 345.1 | 861.9 | 598.9 | 346.7 | ↔ |
| Firenze | 623.6 | 1416.9 | 242.7 | 382.5 | 796.9 | 997.7 | 1397.0 | ↔ | |
| Grosseto | 133.1 | 438.3 | 159.4 | 259.4 | 155.4 | 196.0 | 354.6 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 316.8 | 555.8 | 116.7 | 66.9 | 90.4 | 230.3 | 69.3 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco) | Arezzo | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | ↔ |
| | Firenze | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ↔ |
| | Grosseto | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|--|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | Arezzo | 4.8 | 2.0 | 4.8 | 15.9 | 11.6 | 39.8 | 17.9 | ↔ |
| | Firenze | 7.2 | 5.6 | 5.2 | 7.2 | 16.3 | 27.5 | 17.1 | ↔ |
| | Grosseto | 10.8 | 33.1 | 16.3 | 13.1 | 20.7 | 18.3 | 24.7 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 8.4 | 2.0 | 1.6 | 4.8 | 6.8 | 31.9 | 13.1 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Pinaceae (pino, cedro) | Arezzo | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 7.6 | 0.8 | ↔ |
| | Firenze | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 15.9 | 7.2 | ↔ |
| | Grosseto | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 5.6 | 4.0 | 4.4 | 10.4 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 5.2 | 0.8 | 7.6 | 8.0 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Platanaceae (platano) | Arezzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | ↑ |
| | Firenze | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 6.0 | 10.4 | ↑ |
| | Grosseto | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | ↑ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Salicaceae (pioppo salice) | Arezzo | 59.4 | 16.3 | 34.7 | 70.1 | 87.7 | 63.4 | 28.7 | ↔ |
| | Firenze | 22.7 | 17.1 | 30.7 | 33.1 | 57.8 | 27.5 | 24.7 | ↔ |
| | Grosseto | 20.3 | 47.8 | 19.1 | 29.1 | 36.3 | 9.6 | 19.9 | ↔ |
| | Lido di Camaione | 19.1 | 28.7 | 10.4 | 8.8 | 4.8 | 12.0 | 19.1 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Ulmaceae (olmo) | Arezzo | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | ↓ |
| | Firenze | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 5.6 | ↓ |
| | Grosseto | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | ↓ |
| | Lido di Camaione | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | ↓ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Urticacee (Ortica e Parietaria) | Arezzo | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ↔ |
| | Firenze | 14.7 | 21.1 | 12.4 | 38.6 | 25.9 | 37.9 | 42.2 | ↔ |
| | Grosseto | 5.2 | 12.4 | 24.7 | 19.1 | 15.1 | 37.9 | 59.0 | ↑ |
| | Lido di Camaione | 8.4 | 5.6 | 4.8 | 8.8 | 10.4 | 32.3 | 8.4 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)