

PREVISIONE:
Nella settimana si segnalano concentrazioni basse o nulle per le famiglie di Betulaceae (ontano) e Corylaceae (nocciolo). Pollini di Oleaceae (frassino) presentano valori bassi o nulli ad Arezzo, Firenze e Grosseto mentre presentano un valore alto e uno medio nella stazione di Lido di Camaiore. Pollini di Cupressaceae (cipresso) sono presenti in tutte le stazioni con qualche sporadico valore medio ed elevato nelle stazioni di Firenze, Arezzo e Grosseto.

Settimana dal 18 Gennaio al 24 Gennaio 2021

	stazione	Lun 18	Mar 19	Mer 20	Gio 21	Ven 22	Sab 23	Dom 24	Tendenza	
Betulaceae (ontano, betulla)	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔	
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔	
	Grosseto	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	1.2	0.0	↔	
	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	↔	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente
Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)	Arezzo	0.0	0.0	1.6	3.6	1.2	2.0	0.4	↑	
	Firenze	0.0	0.0	0.4	1.6	0.4	0.4	0.8	↑	
	Grosseto	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	↑	
	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.4	4.0	0.8	0.4	9.6	↑	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente
Cupressacee /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.)	Arezzo	1.2	2.8	8.4	86.9	147.0	68.9	3.6	↑	
	Firenze	0.4	3.2	8.8	131.5	57.4	6.4	4.4	↑	
	Grosseto	0.4	0.8	4.4	29.1	51.4	35.5	6.4	↑	
	Lido di Camaiore	2.4	1.2	0.0	20.3	21.1	0.0	3.6	↑	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	↑	
	Firenze	0.0	2.0	0.4	2.0	0.4	3.6	0.8	↑	
	Grosseto	0.4	1.2	2.8	1.6	0.0	2.4	0.8	↑	
	Lido di Camaiore	0.8	4.4	2.4	33.1	10.8	0.4	3.2	↑	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente

	stazione	Lun 18	Mar 19	Mer 20	Gio 21	Ven 22	Sab 23	Dom 24	Tendenza	
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	0.0	0.0	4.8	1.2	0.0	0.0	0.0	↔	
	Firenze	0.0	0.0	1.6	2.0	0.4	0.0	1.6	↔	
	Grosseto	6.4	0.4	2.8	3.6	4.4	5.6	1.6	↔	
	Lido di Camaiore	2.0	0.4	0.0	8.4	2.0	11.2	2.0	↔	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
										assente

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)