

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si registrano concentrazioni elevate per Plantaginaceae nelle stazioni di Arezzo e Firenze, mentre sono più basse in quelle di Lido e Grosseto. Valori ancora bassi per le Compositae (Ambrosia e Artemisia). Da basse a nulle le concentrazioni per tutte le altre specie con un unico valore medio per Amaranaceae a Grosseto e per Gramineae ad Arezzo.

Settimana dal 24 Luglio al 30 Luglio 2023

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Urticacee | Arezzo | 5.6 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 4.0 | 3.2 |
| (Ortica e Parietaria) | Firenze | 4.4 | 0.8 | 5.2 | 5.6 | 4.4 | 0.8 | 3.2 | ↔ |
| | Grosseto | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 5.6 | 3.6 | 2.0 | ↑ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|---|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Oleaceae | Arezzo | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | Firenze | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↓ |
| | Grosseto | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | ↓ |
| | Lido di Camaiore | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | ↓ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|---|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Gramineae | Arezzo | 12.4 | 8.8 | 9.6 | 8.4 | 0.8 | 4.0 |
| (gramigna orzo, segale, avena granoturco) | Firenze | 5.6 | 3.2 | 6.8 | 6.4 | 4.8 | 4.0 | 6.8 | ↔ |
| | Grosseto | 6.4 | 5.2 | 4.0 | 7.6 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 5.2 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Fagaceae | Arezzo | 8.8 | 5.2 | 3.2 | 7.2 | 3.6 | 3.6 |
| (quercia, faggio castagno) | Firenze | 3.2 | 2.8 | 6.0 | 9.6 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | ↓ |
| | Grosseto | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 8.8 | 6.0 | 2.0 | 0.8 | ↓ |
| | Lido di Camaiore | 2.0 | 0.0 | 3.6 | 10.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | ↓ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Plantaginaceae (piantaggine) | Arezzo | 6.4 | 7.2 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | 3.6 | 6.4 | ↓ |
| | Firenze | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 1.2 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | ↓ |
| | Grosseto | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae) | Arezzo | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | ↑ |
| | Firenze | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↑ |
| | Grosseto | 0.4 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ↑ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 24 | Mar 25 | Mer 26 | Gio 27 | Ven 28 | Sab 29 | Dom 30 | TENDENZA |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc) | Arezzo | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 1.6 | ↔ |
| | Firenze | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | ↔ |
| | Grosseto | 1.6 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 6.4 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | ↔ | |
| | assente | ↓ | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)