

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

 Si segnalano concentrazioni basse o nulle per la spora *Alternaria*
Settimana dal 27 Febbraio al 05 Marzo 2017

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Alternaria		Lun 27	Mar 28	Mer 1	Gio 2	Ven 3	Sab 4	Dom 5	TENDENZA
	Arezzo	0.8	2.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	↔
Firenze	0.4	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	0.4	↔	
Pistoia	nd	nd	nd	nd	nd	2.4	0.8	↔	
Grosseto	0.4	0.0	0.8	0.4	2.0	2.8	0.4	↔	
Lido di Camaiore	0.4	0.0	0.8	0.0	2.4	4.0	0.0	↔	

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento Tendenza stazionaria Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media		
	Concentrazione alta		
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

 Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

 Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

 Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)