


MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

 Concentrazioni medio-alte per la spora fungina *Alternaria* su Firenze e Grosseto, da basse a medie su Lido.

Settimana dal 04 Giugno al 10 Giugno 2018

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Alternaria		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
	Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Firenze	37.1	81.3	37.5	72.1	5.6	124.7	102.8		
Pistoia	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		
Grosseto	nd	nd	84.1	147.8	79.7	389.3	397.3		
Lido di Camaiore	31.1	1.6	15.5	9.6	4.0	13.5	17.1		

	Concentrazione bassa		Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

 Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

 Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

 Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)