

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana campionata i valori della spora fungina *Alternaria* sono bassi in tutte le stazioni ad eccezione di quella di Grosseto dove si rilevano concentrazioni da basse a medie. Tendenza all'aumento.

Settimana dal 13 Maggio al 19 Maggio 2019

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Alternaria		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
	Arezzo	nd	1.2	2.0	1.6	10.0	0.8	2.4	↑
Firenze	2.8	2.4	0.4	1.2	4.8	1.2	2.0	↑	
Grosseto	9.6	19.1	3.6	15.5	27.9	5.2	2.4	↑	
Lido di Camaiore	4.4	3.2	2.4	0.0	0.0	2.0	0.0	↑	

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

 Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpato.toscana.it/tools/qc-code>

 Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

 Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)