

Concentrazione media di cesio-137 in acque superficiali - anni 2012-2021

Corpo idrico	Punto di prelievo	2017	2018	2019	2020*	2021*
		media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)
Fiume Arno	Montelupo F.no (FI)	< 0,006	n.d.	< 0,005	< 0,005	< 0,006
Fiume Arno	Calcinaia (PI)	< 0,007	n.d.	< 0,006	n.d.	n.d.
Fiume Ombrone	Istia d'Ombrone (GR)	< 0,010	n.d.	< 0,005	n.d.	n.d.
Fiume Serchio	Vecchiano (PI)	< 0,006	n.d.	< 0,004	n.d.	n.d.
Fiume Tevere	Sansepolcro (AR)	< 0,005	n.d.	< 0,005	n.d.	n.d.

Corpo idrico	Punto di prelievo	2012	2013	2014	2015	2016
		media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)	media annua (Bq/l)
Fiume Arno	Montelupo F.no (FI)	< 0,001	< 0,009	< 0,009	< 0,010	< 0,013
Fiume Arno	Calcinaia (PI)	< 0,001	< 0,01	< 0,013	< 0,010	< 0,009
Fiume Ombrone	Istia d'Ombrone (GR)	< 0,003	< 0,009	< 0,008	< 0,009	< 0,008
Fiume Serchio	Vecchiano (PI)	n.d.	< 0,01	< 0,009	< 0,010	< 0,009
Fiume Tevere	Sansepolcro (AR)	n.d.	< 0,008	< 0,009	< 0,011	< 0,008

n.d. dati non disponibili

*Nel 2020 e nel 2021 è stato effettuato soltanto il monitoraggio del fiume Arno in un unico punto di prelievo in conseguenza delle misure adottate a seguito dell'emergenza sanitar

ia